

## Stostīšanas skrīninga aptauja / Screening List for Stuttering (SLS)

Vārds, uzvārds:

Aizpildīja:

Dzimšanas dati:

Vecums:

Izpētes datums:

Lūdzu, sniedziet bērna runas novērtējumu, atzīmējot to izteikumu, kas visticamāk atbilst šī brīža situācijai.

<b>A daļa: Runas plūduma neritmiskuma veids</b>	<b>Vērtējums</b>
<input type="checkbox"/> Atkāрто teikumu vai veselu vārdu.	1
<input type="checkbox"/> Atkāрто vārda skaņu vai skaņas 2-3 reizes bez sasprindzinājuma.	2
<input type="checkbox"/> Atkāрто vārda skaņu vai skaņas 4 un vairāk reizes.	3
<input type="checkbox"/> Balss sasprindzinājums, veicot atkārtojumu.	4
<input type="checkbox"/> Blokādes, runas plūduma pārrāvums (apstāšanās vārdā).	5
<b>B daļa: Bērna reakcija runās plūduma pārrāvuma brīdī</b>	<b>Vērtējums</b>
<input type="checkbox"/> Nav reakcijas. Reakcija nav redzama.	1
<input type="checkbox"/> Baidoties no atkārtojumiem, mēģina vārdus pārveidot.	2
<input type="checkbox"/> Sasprindzinās, lai varētu izteikt vārdus. Sejas sasprindzinājums, grimases un / vai galvas, roku, kāju pavadošās kustības.	3
<b>C daļa: Runas plūduma pārrāvumu biežums</b>	<b>Vērtējums</b>
<input type="checkbox"/> Nekad vai ļoti reti.	1
<input type="checkbox"/> Bieži. Viens pārrāvums 2-3 teikumos.	2
<input type="checkbox"/> Ļoti bieži. Viens vai vairāki pārrāvumi katrā teikumā.	3
<b>D daļa: Apkārtējo personu reakcija</b>	<b>Vērtējums</b>
<input type="checkbox"/> Nav nozīmes. Runas plūduma pārrāvumi nevienu nesatrauc.	1
<input type="checkbox"/> Vecāki ir noraizējušies.	2
<input type="checkbox"/> Bērns reaģē uz apkārtējo personu reakciju (piem., ākstās)	3
<b>E daļa: Kopš kura laika ir runas plūduma pārrāvumi</b>	<b>Vērtējums</b>
<input type="checkbox"/> Līdz šim nav novēroti.	1
<input type="checkbox"/> Ne ilgāk kā 4 mēnešus.	2
<input type="checkbox"/> No 4 līdz 12 mēnešiem.	3
<input type="checkbox"/> Vairāk kā 12 mēnešus.	4

Kopējais punktu skaits ...

**Novērtējums:**

**Punktu summa < 7 logopēda konsultācija nav nepieciešama**

**>12 iespējama stostīšanās**

**7-12 atkārtots skrīnings pēc 3 mēnešiem**

## **Stostīšanās skrīninga aptauja (SLS – Screening List for Stuttering)**

Aptauja diferenciālajai diagnostikai, lai identificētu stostīšanos (pēc Riley, 1989).

### ***Mērķis***

SSA (SLS) aptauja sniedz iespēju vecākiem un bērnu ārstiem atpazīt runas plūduma pārrāvumus un stostīšanos, kad ir nepieciešama papildu diagnostika un interence.

### ***Metode***

SSA (SLS) ir aptauja, kur vecāki atzīmē atbilstošo variantu. Tā tika izveidota, lai bērnu ārstiem būtu ātrs un uzticams skrīninga instruments. Aptaujā ir jautājumi, lai iegūtu informāciju par pārtraukta runas plūduma veidu, biežumu un simptomu ilgumu, kā arī par bērna un apkārtējo personu reakciju uz runas plūduma pārtraukumiem. Atbildes saņem atšķirīgu vērtējumu ballu (punktu) formā. Punktu summa sniedz informāciju par terapijas nepieciešamību.

### ***Vērtēšana***

Punktu summa  $< 7$  nav nepieciešama diagnostika;

$>12$  iespējams stostās;

7 – 12 jāatkārto skrīnings pēc 3 mēnešiem.

### ***Diskusija par lietojumu***

SSA (SLS) flāmu versija „*Detectie Instrument voor Stotteren*” (DIS) ir aprobēta, veicot 700 bērnu pārbaudi, kas apliecināja augstu korelāciju ar SPI (Stes, Boey, 1998). SSA nav instruments logopēdiskajai diagnosticēšanai, jo logopēds var sasniegt tikpat labu rezultātu, uzdodot vecākiem mērķtiecīgus jautājumus. SSA ir instruments visiem, kuri saskaras ar jautājumu, vai ir nepieciešama logopēdiskā izpēte, un tā izmantošanai nav nepieciešamas speciālas zināšanas šajā jomā vai liels laika patēriņš, piemēram, ārstiem un audzinātājiem.

Anketas aizpildīšanas laiks: 5 – 10 minūtes (laiks, kas nepieciešams, lai vecāki aizpildītu anketu).

Anketas izvērtēšanas laiks: 2 minūtes.